

Tableau I : Exemple de tableau dans les enquêtes d'incidence

Les taux sont les taux d'incidence (de la maladie ou de l'état de santé)

(Variables qualitatives)	Incidence de l'arrêt d'allaitement à 1 mois (%)	RR (IC à 95 %)	p
Age < 30 ans	17.6 %	4.64	< 10 ⁻⁴
≥ 30 ans	3.8 %	(1.76 - 12.22)	
Primipares	14.1 %	2.31	0.043
Multipares	6.1 %	(1.00 - 5.36)	
Mère allaitée : oui	5.6 %	0.47	0.11
non	11.9 %	(0.18 - 1.24)	
IMC > 30	15.4 %	1.70	0.44
IMC ≥ 30	9.0 %	(0.44 - 6.53)	
Reprise du travail : oui	5.6 %	0.35	0.01
non	16.0 %	(0.15 - 0.81)	

(Variables quantitatives)	Arrêt allaitement à 1 mois	Pas d'arrêt d'allaitement à 1 mois	p
Age (ans)	27.2 ± 4.4	31.2 ± 4.7	0.004
IMC (kg/m ²)	23.9 ± 4.1	22.3 ± 3.9	0.06

Tableau II : Exemple du premier tableau dans les enquêtes cas-témoins

Les taux sont les taux d'exposition à la maladie ou à l'état de santé (facteurs supposés liés)

(Les deux groupes (cas et témoins) doivent être identiques)	Cas N=79	Témoins N=71	p
Age mère (ans)	30.2 ± 5.4	29.3 ± 5.1	0.31
Primiparité (%)	31.4	45.3	0.09
Sexe (% garçons)	62.9	50.0	0.13

Tableau III : Exemple du deuxième tableau dans les enquêtes cas-témoins

(Les critères de jugement)	Cas n=79	Témoins n=71	OR IC à 95 %	p
Périmètre abdominal (mm)	374 ± 17	344 ± 23		< 10 ⁻⁶
PA > 350 mm (%)	91.4	40.6	15.22 5.53 - 49.47	< 10 ⁻⁴
Césarienne (%)	26.6	21.1	1.5 0.59 - 3.12	0.43
Episio (%) pour les voies basses	N=58 37.9	N=56 35.7	1.10 0.48 - 2.53	0.80